

# ยาสามัญประจำ

## บ้าน

(แผนปัจจุบัน, แผนโบราณ)



คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

รายวิชายาในชีวิตประจำวัน 3/2557

# วัตถุประสงค์

- ทราบความหมาย ระบุยาสามัยัญประจำบ้านได้
- จำแนกกลุ่มของยาสามัยัญประจำบ้านได้
- ใช้ยาสามัยัญประจำบ้านได้อย่างถูกต้องรวมถึงวิธีการ  
เก็บรักษา



# ยาสามัญประจำบ้าน

## (HOUSEHOLD REMEDY)

○ ยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาคัดเลือกกว่าเป็นยาที่เหมาะสมสำหรับให้ประชาชนหาซื้อมาใช้ด้วยตนเอง เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย



เกิดขึ้นได้

- ✓ มีความปลอดภัยสูง
- ✓ ราคาไม่แพง
- ✓ หาซื้อมาใช้ได้ด้วยตนเอง

# ฉลากยาสามัญประจำบ้าน

- ชื่อยาตามประกาศ กรณีมีชื่อการค้าต้องแสดงชื่อตามประกาศควบคู่
- คำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” ในกรอบสีเขียว
- คำว่า “ยาสิ้นอายุ” และแสดงวัน เดือน ปี พ.ศ.
- ระบุตำรับยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือน การเก็บรักษาและขนาดบรรจุ



# ข้อแนะนำทั่วไปในการใช้ยาสามัญประจำบ้าน

- มีข้อมูลเรื่องยาที่ต้องการใช้
- ใช้ยาในช่วงเวลาอันสั้น
- ยาน้ำทุกชนิด ต้องเขย่าขวดก่อนใช้
- หากอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่มีฉลากระบุตัวยาและวิธีการใช้ยา
- ในกรณีที่สงสัยว่าแพ้ยา ควรหยุดยาทันทีและรีบปรึกษาแพทย์ อย่าเปลี่ยนยาเอง




## กรณีต่อไปนี้ไม่ควรเลือกใช้ยาด้วยตัวเอง

- กำลังใช้ยาบางชนิดอยู่เป็นประจำ เช่น ยารักษาโรค  
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
- อากาศมีความรุนแรงหรือเป็นเรื้อรัง
- กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- ใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี หรือผู้สูงอายุเกิน 60 ปี



# การเก็บรักษายา

- เก็บยารับประทานและยาใช้ภายนอกแยกออกจากกัน
  - ต้องมีฉลากและไม่เลือน
  - เก็บยาไว้ในตู้ให้พ้นมือเด็ก
  - เก็บยาไว้ในที่แสงส่องไม่ถึง ห่างไกลจากความร้อนชื้น/ เปลวไฟ
  - อย่าเก็บยาฆ่าแมลง ยาเบื่อหนู หรือสารพิษอื่นในตู้ยา
- 

## ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น  
ท้องเฟ้อ
2. ยาแก้ท้องเสีย
3. ยาระบาย
4. ยาถ่ายพยาธิลำไส้
5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้
6. ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก
7. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ
8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด  
คัดจมูก
9. ยาแก้เมารถ เมาเรือ
10. ยาสำหรับโรคตา
11. ยาสำหรับโรคปากและลำคอ
12. ยาใส่แผล ล้างแผล
13. ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อน  
ลวก
14. ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ  
แมลงกัดต่อย
15. ยาสำหรับโรคผิวหนัง
16. ยาบำรุงร่างกาย

มียา 58 รายการ

\*\*\*จะมีการปรับปรุงรายการยาสามัญประจำบ้านใหม่ได้เสมอ\*\*\*





## 1.1 ยาเม็ดลดกรด อะลูมิเนียม

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ  
 Aluminium Hydroxide 200-  
 Magnesium Hydroxide 200-400 mg.




ขวดท้อง



อ



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน  | การเก็บรักษา                                  | ขนาดบรรจุ   |
|--|--|--|---|---|
| บรรเทาอาการ<br>จุกเสียด ท้อง<br>ขึ้น ท้องเฟ้อ<br>และปวดท้อง<br>เนื่องจากมี<br>กรดมาก ใน<br>กระเพาะ<br>อาหารหรือ<br>แผลใน<br>กระเพาะ<br>อาหารและ<br>ลำไส้ | เคี้ยวยาก่อนกลืน<br>รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง<br>หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมี<br>อาการ<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2<br>เม็ด<br>(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณา<br>ตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับ<br>มนุษย์พิจารณาตามขนาด ที่ถูกต้อง<br>ตามสูตร ตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้น<br>ทะเบียนตำรับยา) | 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรค<br>ไต<br>2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานาน<br>กว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง<br>สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มี<br>ผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ<br>Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่<br>เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำ<br>เตือนดังนี้<br>1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต<br>2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานาน<br>กว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง | เก็บที่อุณหภูมิ<br>ต่ำกว่า 40<br>องศาเซลเซียส | แผง<br>พลาสติก<br>หรือ<br>อลูมิเนียม<br>ละ 4 และ<br>10 เม็ด |



## 1.2 ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย


ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Aluminium Hydroxide 165-650 mg.

Magnesium Hydroxide 103-500 mg.



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน  | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ                                      |
|--|---|--|---|--|
| บรรเทาอาการ<br>จุกเสียด ท้อง<br>ขึ้น ท้องเฟ้อ<br>และปวดท้อง<br>เนื่องจากมี<br>กรดมาก ใน<br>กระเพาะ<br>อาหารหรือ<br>แผลใน<br>กระเพาะ<br>อาหารและ<br>ลำไส้ | เขย่าขวดก่อนใช้ยา<br>รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือ<br>หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 ช้อนชา<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อน<br>ชา<br>เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อน<br>ชา<br>(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับ<br>ยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์<br>พิจารณาตาม ขนาดที่ถูกต้องตามสูตร<br>ตำรับ ที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับ<br>ยา) | 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรค<br>ไต<br>2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานาน<br>กว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง<br>สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มี<br>ผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ<br>Sodium ในขนาดรับประทานต่อวัน<br>ไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำ<br>เตือนดังนี้<br>1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต<br>2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานาน<br>กว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง | เก็บที่<br>อุณหภูมิ<br>ต่ำกว่า 40<br>องศา<br>เซลเซียส | ขวดละ 240<br>มิลลิลิตร<br>และ 450<br>มิลลิลิตร |



### 1.3 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดาไมน์ท์

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Bicarbonate 300 mg.

Peppermint Oil 0.003 ml.



| สรรพคุณ   | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน  | การเก็บรักษา   | ขนาดบรรจุ   |
|---|--|--|--|---|
| บรรเทาอาการ<br>จุกเสียด ลด<br>อาการระคาย<br>เคือง เนื่องจาก<br>มีกรดมากใน<br>กระเพาะอาหาร | รับประทานหลังอาหาร 1<br>ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-6<br>เม็ด<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้ง<br>ละ 1-3 เม็ด | 1) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรค<br>ไต<br>2) ไม่ควรรับประทาน<br>เป็นเวลานานกว่า 2<br>สัปดาห์ นอกจากแพทย์<br>สั่ง | เก็บที่<br>อุณหภูมิ ต่ำ<br>กว่า 40<br>องศา<br>เซลเซียส | แผง<br>พลาสติก<br>หรือ<br>อลูมิเนียม<br>ละ 4 และ<br>10 เม็ด |

## 1.4 ยาขับลม

ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ

Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml.

Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml.

Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml.



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน  | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ  |
|--|--|--|---|--|
| บรรเทา<br>อาการ<br>ท้องขึ้น<br>ท้องอืด<br>ท้องเฟ้อ<br>และขับลม<br>ใน<br>กระเพาะ<br>อาหาร | เขย่าขวดก่อนใช้ยา<br>รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1<br>ช้อนโต๊ะ<br>(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยา<br>แผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณา<br>ตามขนาด ที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับ<br>อนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา) | ยานี้มี<br>แอลกอฮอล์<br>ผสมอยู่<br>.....% ควรใช้<br>ด้วยความ<br>ระมัดระวัง | เก็บที่<br>อุณหภูมิที่<br>ต่ำกว่า 40<br>องศา<br>เซลเซียส<br>และป้องกัน<br>ไม่ให้ถูก<br>แสงแดด | ขวดละ 180<br>มิลลิลิตร<br>240<br>มิลลิลิตร<br>และ 450<br>มิลลิลิตร |



## 1.5 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง

ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ

Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g. , Compound Rhubarb

Tincture 0.50-2.00 ml. และ/หรือ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่

Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml. ,

Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml.

Compound Tinospora Tincture 0.50 ml., Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml.

Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml., Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml.,

Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml. และ/หรือ Volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่

Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml., Peppermint Oil 0.03-0.20 ml., Menthol 0.05-0.30 ml., Concentrated

Dill Water 0.10 ml., Camphor 19.00 mg.



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน   | การเก็บรักษา   | ขนาดบรรจุ  |
|--|--|---|--|--|
| บรรเทา<br>อาการปวด<br>ท้อง<br>เนื่องจากจุก<br>เสียด ท้องขึ้น<br>ท้องเฟ้อ | เขย่าขวดก่อนใช้ยา<br>รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อน<br>โต๊ะ (โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยา<br>แผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณาตาม<br>ขนาดที่ถูกต้องตามสูตร ตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอ<br>ขึ้นทะเบียนตำรับยา) | 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็น<br>โรคหัวใจหรือโรคไต<br>2) ไม่ควรรับประทานเป็น<br>เวลานานกว่า 2 สัปดาห์<br>นอกจากแพทย์สั่ง<br>3) ยานี้มีแอลกอฮอล์<br>ผสมอยู่ .....% ควรใช้<br>ด้วยความระมัดระวัง | เก็บที่อุณหภูมิ<br>ต่ำกว่า 40<br>องศาเซลเซียส<br>และป้องกัน<br>ไม่ให้ถูก<br>แสงแดด | ขวดละ 180<br>มิลลิลิตร 240<br>มิลลิลิตร และ<br>450 มิลลิลิตร |



## 1.6 ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Bicarbonate 50 mg.

โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ **Alcohol** เป็นส่วนผสม



| สรรพคุณ   | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน  | การเก็บรักษา   | ขนาดบรรจุ             |
|---|--|--|--|-----------------------|
| บรรเทา<br>อาการ<br>ท้องอืด ท้อง<br>ขึ้น ท้องเฟ้อ<br>เนื่องจากมี<br>กรดมากใน<br>กระเพาะ<br>อาหาร | ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลัง<br>อาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควร<br>ให้เกินวันละ 6 ครั้ง<br>เด็กอายุ 2-3 ปี ครั้งละ 2-3 ช้อน<br>ชา<br>เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 2<br>ช้อนชา<br>เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 1<br>ช้อนชา<br>ทารกแรกเกิด-1 เดือน ไม่ควรใช้ | 1) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็น<br>โรคหัวใจหรือโรคไต<br>2) ไม่ควรรับประทาน<br>เป็นเวลานานกว่า 2<br>สัปดาห์ นอกจากแพทย์<br>สั่ง | เก็บที่อุณหภูมิ<br>ต่ำกว่า 40<br>องศาเซลเซียส<br>และป้องกัน<br>ไม่ให้ถูก<br>แสงแดด | ขวดละ 60<br>มิลลิลิตร |



## 1.7 ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงค์

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Asafetida 20 % w/v



| สรรพคุณ                                    | ขนาดและวิธีใช้                     | คำเตือน              | การเก็บรักษา   | ขนาดบรรจุ  |
|--|------------------------------------|----------------------|--|--|
| บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก | ทาบางๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง | <b>ห้ามรับประทาน</b> | เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดละ 15 มิลลิลิตร 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร |





# 1.8 ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน

(เพิ่มตามประกาศฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Aluminium Hydroxide 200-600 mg.

Magnesium Hydroxide 200-400 mg.

Simethicone 40-125 mg.



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน  | การเก็บรักษา                           | ขนาดบรรจุ                                |
|--|--|--|--|--|
| บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และช่วยขับลม | เคี้ยวยาก่อนกลืน<br>รับประทานก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 4 เม็ด<br>เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 - 2 เม็ด<br>(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา) | 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต<br>2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์<br>3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน 2 ชั่วโมง<br>สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 มิลลิคิควาเลนต์ (115 มิลลิกรัม) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้ 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต<br>2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์<br>3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน 2 ชั่วโมง | เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส | แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด |






# 1.9 ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน

(เพิ่มตามประกาศฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555) ในสูตรตำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

- Aluminium Hydroxide 165-650 mg.
- Magnesium Hydroxide 103-500 mg.
- Simethicone 20-40 mg.

| สรรพคุณ   | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน   | ขนาดบรรจุ   |
|---|--|---|---|
| บรรเทาอาการ<br>จุกเสียด ท้อง<br>ขึ้น ท้องเฟ้อ<br>ปวดท้อง<br>เนื่องจากมี<br>กรด<br>มากใน<br>กระเพาะ<br>อาหารหรือ<br>แผลใน<br>กระเพาะ<br>อาหารและ<br>ลำไส้ และช่วย<br>ขับลม | เขย่าขวดก่อนใช้ยา<br>รับประทานก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือหลัง<br>อาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 4 ช้อนชา<br>เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 - 2<br>ช้อนชา<br>เด็กอายุ 3 - 6 ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง - 1<br>ช้อนชา<br>(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยา<br>แผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตาม<br>ขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอ<br>ขึ้นทะเบียนตำรับยา) | 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต<br>2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2<br>สัปดาห์<br>3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น<br>ควรรับประทานห่างกัน 2 ชั่วโมง<br>สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผล<br>วิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ใน<br>ขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 มิลลิอิกวิวา<br>เลนท์ (115 มิลลิกรัม) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้<br>1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต<br>2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2<br>สัปดาห์<br>3) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น<br>ควรรับประทานห่างกัน 2 ชั่วโมง | เก็บที่<br>อุณหภูมิต่ำ<br>กว่า 30<br>องศา<br>เซลเซียส |
|   |  |   | ขวดละ<br>240<br>และ<br>450<br>มิลลิลิตร               |



## 1.10 ยาผงฟูซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต

(เพิ่มตามประกาศฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)

ในสูตรตำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Citric acid anhydrous ไม่เกิน 1.850 กรัม

Sodium bicarbonate ไม่เกิน 1.960 กรัม

Sodium carbonate ไม่เกิน 0.430 กรัม



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน  | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ                                |
|--|--|--|---|--|
| ลดกรด<br>บรรเทา<br>อาการ<br>ท้องอืด<br>ท้องเฟ้อ<br>เนื่องจากมี<br>กรดมากใน<br>กระเพาะ<br>อาหาร | ผสมน้ำค่อนแก้วรับประทาน หลังหมด<br>ฟองฟู<br>ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ครั้งละ 1<br>ซอง รับประทานซ้ำได้อีกภายใน 2 หรือ 3<br>ชั่วโมง ถ้าต้องการ (โดยให้<br>คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผน<br>ปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตาม<br>ขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับ<br>อนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา) | 1) ห้ามใช้ในผู้ที่<br>เป็นโรคหัวใจ โรค<br>ความดันโลหิตสูง<br>หรือโรคไต<br>2) ไม่ควร<br>รับประทานเป็น<br>เวลานานกว่า 2<br>สัปดาห์ นอกจาก<br>แพทย์สั่ง | เก็บที่<br>อุณหภูมิ<br>ต่ำกว่า<br>30 องศา<br>เซลเซียส | ซอง<br>อลูมิเนียม<br>ไม่เกิน 4.3<br>กรัม |



11

# 1.11 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมธิโคน

(เพิ่มตามประกาศฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555)

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Simethicone 40 มิลลิกรัม และ 80 มิลลิกรัม



5/5/42

| สรรพคุณ                              | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน   | การเก็บรักษา                                  | ขนาดบรรจุ   |
|--------------------------------------|--|---|---|---|
| บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด | <p>เคี้ยวก่อนกลืน (เฉพาะชนิดเม็ด)</p> <p>ขนาด 40 มิลลิกรัม ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการ วันละ 4 ครั้ง (ไม่เกินวันละ 12 เม็ด)</p> <p>ขนาด 80 มิลลิกรัม ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เมื่อมีอาการ วันละ 4 ครั้ง (ไม่เกินวันละ 6 เม็ด)</p> | <p>1) หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร</p> <p>2) ยานี้ไม่ใช่ยาลดกรด เคลือบแผลในกระเพาะอาหาร</p> | <p>เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส</p> | <p>ชนิดเม็ดบรรจุแผง</p> <p>อะลูมิเนียมชนิดแคปซูล</p> <p>บรรจุแผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียม</p> <p>แผงละไม่เกิน 10 เม็ด/แคปซูล</p> |

## 2.1 ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ไขตามประกาศฉบับที่4 พ.ศ.2555)

ในสูตรตำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium Chloride 0.875 g.,

Sodium Bicarbonate 0.625 g. , Potassium Chloride 0.375 g., Glucose - Anhydrous 5.000 g.

หรือ ในสูตรตำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Chloride 0.875 g., Trisodium Citrate Dihydrate 0.725 g..

Potassium Chloride 0.375 g., Glucose Anhydrous 5.000 g.

หรือ ในสูตรตำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Chloride 0.650 g., Trisodium Citrate, Dihydrate 0.725 g.

Potassium Chloride 0.375 g., Glucose Anhydrous 3.375 g.



| สรรพคุณ   | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน   | การเก็บรักษา   | ขนาดบรรจุ                               |
|---|---|---|--|---|
| ทดแทนการเสียน้ำในรายที่มีอาการท้องร่วงหรือในรายที่มีอาเจียนมากๆ และป้องกันการช็อคเนื่องจากการที่ร่างกายขาดน้ำ | <p>เทผงยาทั้งซองละลายในน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว ประมาณ 250 มิลลิลิตร (1 แก้ว) ให้ดื่มมากๆ เมื่อเริ่มมีอาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบ่อยให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียนด้วยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง</p> <p>เด็กอายุมากกว่า 2 ปี-ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ ประมาณ 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) ต่อการถ่ายอุจจาระ 1 ครั้ง หรือตามความกระหายของผู้ป่วย</p> <p>เด็กอ่อน-เด็กอายุ 2 ปี ให้ดื่มทีละน้อยสลับกับน้ำเปล่า ประมาณวันละ 4 ซองหรือมากกว่าที่คนไข้ต้องการและดื่มต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น</p> | <p>1) ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้</p> <p>2) ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการอาเจียนมาก หงื่อออกมาก ตัวเย็น ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป หรือหมดสติ ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วน</p> | <p>1) เก็บในที่แห้ง และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด</p> <p>2) ยาที่ละลายน้ำแล้วเกิน 24 ชั่วโมง ไม่ควรใช้</p> | <p>1 ซอง สำหรับผสมน้ำ 250 มิลลิลิตร</p> |

## 2.2 ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย (เพิ่มตามประกาศฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาลำคัญ คือ

Activated charcoal 250-350 มก.



| สรรพคุณ            | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน  | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ                          |
|--------------------|---|--|---|------------------------------------|
| รักษาอาการท้องเสีย | <p>รับประทานยานี้ก่อนหรือหลังรับประทานยาอื่น ๆ 2 ชั่วโมง</p> <p>ผู้ใหญ่ และเด็ก อายุมากกว่า 2 ปี รับประทานครั้งละ 3 - 4 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง</p> <p>(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับยาอื่น</li> <li>รับประทานยาผงถ่านนี้แล้วอุจจาระจะมีสีค่อนข้างดำ</li> <li>ถ้าอาการท้องเสียยังไม่ดีขึ้นภายใน 2 - 3 วัน หลังรับประทานยาควรปรึกษาแพทย์</li> </ol> | <p>เก็บในแห้ง และ อุดมภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส</p> | <p>แผงละไม่เกิน 10 เม็ด/แคปซูล</p> |

### 3.1 ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับเด็ก

ในสูตรตำรับ 1 แห่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Glycerin 91 % w/w




| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน            | การเก็บรักษา                            | ขนาดบรรจุ                |
|--|--|--------------------|---|--------------------------|
| สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพื่อช่วยการขับถ่าย | ใช้เมื่อต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที เพื่อให้ตัวยาละลายเหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แห่ง | ไม่ควรใช้เป็นประจำ | เก็บในตู้เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | แห่งละ 1.5 กรัม บรรจุแผง |




### 3.2 ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับผู้ใหญ่

ในสูตรตำรับ 1 แห่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Glycerin 91 % w/w



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน            | การเก็บรักษา                            | ขนาดบรรจุ                 |
|--|--|--------------------|---|---------------------------|
| สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพื่อช่วยการขับถ่าย | ใช้เหน็บทวารหนัก ครั้งละ 1 แห่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที เพื่อให้ตัวยาละลาย | ไม่ควรใช้เป็นประจำ | เก็บในตู้เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | แห่งละ 2.55 กรัม บรรจุแผง |





### 3.3 ยาระบายแมกนีเซีย

ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ

Magnesium Hydroxide 1.2 g.



| สรรพคุณ | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน   | การเก็บรักษา                                     | ขนาดบรรจุ                                   |
|---------|---|---|--|---|
| ยาระบาย | <p>เขย่าขวดก่อนใช้ยา</p> <p>รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า</p> <p>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ (30-45 มิลลิลิตร)</p> <p>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร)</p> <p>เด็ก 1-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 ช้อนชา ( 5-15 มิลลิลิตร)</p> | <p>1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้ อาเจียน</p> <p>2) ไม่ควรรับประทานเป็นประจำ</p> | <p>เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส</p> | <p>ขวดละ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร</p> |





### 3.4 ยาระบายมะขามแขก

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

ฝักมะขามแขกที่เอาเมล็ดออกแล้ว

ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B 7.5 mg.



| สรรพคุณ     | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน   | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ   |
|-------------|--|---|---|---|
| ยา<br>ระบาย | รับประทานก่อนนอน<br>หรือตื่นนอนเช้า<br>ผู้ใหญ่ รับประทาน<br>ครั้งละ 3-4 เม็ด<br>เด็ก 6-12 ปี<br>รับประทานครั้งละ<br>1-2 เม็ด | 1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวด<br>ท้องหรือคลื่นไส้อาเจียน<br>2) หญิงมีครรภ์หรือให้นม<br>บุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อน<br>ใช้ยา<br>3) ไม่ควรรับประทานเป็น<br>ประจำ | เก็บในที่<br>แห้ง และ<br>อุณหภูมิ<br>ต่ำกว่า 30<br>องศา<br>เซลเซียส | แผง<br>พลาสติก<br>หรือ<br>อลูมิเนียม<br>มละ 4<br>และ 10<br>เม็ด |

### 3.5 ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ  
Sodium Chloride 15 % w/v



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้   | ค่าเตือน               | การเก็บรักษา   | ขนาดบรรจุ   |
|--|--|------------------------|--|---|
| สำหรับ<br>บรรเทา<br>อาการ<br>ท้องผูก<br>ใช้สวน<br>ทวารให้<br>ถ่าย<br>อุจจาระ | สวนเข้าทางทวารหนัก แล้วกลั้นไว้<br>จนทนไว้ไหวจึงเข้าส้วม<br>ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ 20-40 มิลลิลิตร<br>เด็ก 6-12 ปี ใช้ครั้งละ 10-20<br>มิลลิลิตร<br>เด็ก 1-6 ปี ใช้ครั้งละ 5-10<br>มิลลิลิตร | ไม่ควรใช้<br>เป็นประจำ | เก็บที่<br>อุณหภูมิตำ<br>กว่า 40<br>องศา<br>เซลเซียส | หลอด<br>พลาสติก<br>10<br>มิลลิลิตร<br>และ 20<br>มิลลิลิตร |



## 4.1 ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Mebendazole 100 mg.



| สรรพคุณ                 | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน   | การเก็บรักษา                  | ขนาดบรรจุ                                |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| ถ่ายพยาธิเส้นด้ายตัวกลม | <p>เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน</p> <p>สำหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเย็นเพียงครั้งเดียว</p> <p>สำหรับพยาธิตัวกลมอื่นๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน และพยาธิไส้เ็น้มา ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน 3 วัน และอาจรับประทานซ้ำอีก 1 เม็ด หลังจากการรักษาครั้งแรก 2 สัปดาห์ต่อมา</p> | <p>1) ไม่ควรใช้</p> <p>ในหญิงมีครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก และผู้ที่เป็นโรคตับ</p> <p>2) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี</p> | <p>ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด</p> | <p>แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 6 เม็ด</p> |

## กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้

# ยากินเล็ก

### 5.1 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้แอสไพริน

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Aspirin 325 mg.

\*\*\* ได้ยกเลิกการเป็นยาสามัญประจำบ้าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 เนื่องจากได้พบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้

| สรรพคุณ                         | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน  | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ   |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| ลดไข้<br>บรรเทา<br>อาการ<br>ปวด | รับประทานหลังอาหารทันทีหรือ<br>ขณะท้องไม่ว่างแล้วดื่มน้ำตา<br>มมากๆ<br>รับประทานทุกๆ 4 –6 ชั่วโมงเมื่อมี<br>อาการ ไม่ควรรับประทานเกินวัน<br>ละ 5 ครั้ง<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1<br>เม็ด<br>เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2<br>เม็ด | 1) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี<br>และหญิงมีครรภ์ระยะใกล้คลอด<br>2) ห้ามใช้สำหรับลดไข้ในผู้ที่ป่วย<br>เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส และ<br>ใช้เลือดออก<br>3) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคแผลใน<br>ระบบทางเดินอาหารและโรคหอบ<br>หืด<br>4) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการ<br>ปวดเมื่อยเนื่องจากการทำงาน<br>หนัก | เก็บที่<br>อุณหภูมิ<br>ต่ำกว่า<br>40 องศา<br>เซลเซียส | แผง<br>พลาสติก<br>หรือ<br>อลูมิเนียม<br>ละ 4 และ<br>10 เม็ด |

## 5.2 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก.

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol 500 mg.



| สรรพคุณ                         | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน   | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ   |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| ลดไข้<br>บรรเทา<br>อาการ<br>ปวด | รับประทานทุก 4 หรือ<br>6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ<br>ไม่ควรรับประทานเกิน<br>วันละ 4 ครั้ง<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้ง<br>ละ 1-2 เม็ด<br>เด็ก 6-12 ปี<br>รับประทานครั้งละ<br>1/2-1 เม็ด | 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บน<br>ฉลาก หรือเอกสารกำกับยา จะทำ<br>ให้เป็นพิษต่อ ตับได้ และไม่ควรใช้<br>ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน<br>2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควร<br>ปรึกษาแพทย์หรือ เภสัชกรก่อนใช้<br>ยานี้<br>3) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวด<br>เมื่อย เนื่องจากการทำงานหนัก | เก็บที่<br>อุณหภูมิ<br>ต่ำกว่า<br>40 องศา<br>เซลเซียส | แผง<br>พลาสติก<br>หรือ<br>อลูมิเนียม<br>ละ 4 และ<br>10 เม็ด |



### 5.3 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 มก.

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Paracetamol 325 mg.

| สรรพคุณ                         | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน   | การเก็บรักษา                              | ขนาดบรรจุ                                     |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| ลดไข้<br>บรรเทา<br>อาการ<br>ปวด | รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควร รับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด<br>เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้ง ละ 1/2 เม็ด | 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน<br>2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควร ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ ยานี้<br>3) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวด เมื่อย เนื่องจากการทำงานหนัก | เก็บที่ อุณหภูมิ ต่ำกว่า 40 องศา เซลเซียส | แผง พลาสติก หรือ อลูมิเนียม มละ 4 และ 10 เม็ด |



# 5.4 ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาลำคัญ คือ

Paracetamol 120 mg.

โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ **Alcohol** เป็นส่วนผสม

| สรรพคุณ                     | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน  | การเก็บรักษา                                     | ขนาดบรรจุ  |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| ลดไข้<br>บรรเทา<br>อาการปวด | <p>รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควร รับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง</p> <p>- สำหรับขนาดบรรจุขวดละ <u>60 มิลลิลิตร</u> พร้อมช้อนชา ให้แสดงขนาดรับประทานดังนี้</p> <p>เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มล.); เด็กอายุ 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา (2.5-5 มล.); เด็กอายุ 6 เดือน-1 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มล.)</p> <p>- สำหรับขนาดบรรจุขวดละ <u>30 มิลลิลิตร</u> พร้อมหลอดหยด ให้แสดงขนาดรับประทานดังนี้</p> <p>เด็กอายุ 4-5 เดือน รับประทานครั้งละ 2 หลอดหยด (2.4 มล.); เด็กอายุ 2-3 เดือน รับประทานครั้งละ 1/2 หลอดหยด (1.8 มล.); เด็กแรกเกิด -1 เดือน รับประทานครั้งละ 1 หลอดหยด (1.2 มล.)</p> | <p>1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ จะทำให้เป็นพิษ ต่อตับได้ และไม่ ควรใช้ยานี้ ติดต่อกันเกิน 5 วัน</p> <p>2) ผู้ที่เป็นโรค ตับ โรคไต ควร ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนใช้ยานี้</p> | <p>เก็บที่ อุณหภูมิ ต่ำกว่า 40 องศา เซลเซียส</p> | <p>ขวดสีชา 30 มิลลิลิตรใน กล่องกระดาษ พร้อมหลอด หยด (1.2 มิลลิลิตร) และ ขวดสีชา 60 มิลลิลิตรใน กล่องกระดาษ พร้อมช้อนชา</p> |





## 5.5 พลาสเตอร์บรรเทาปวด

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Borneol 0.21-1.00 %w/w, Camphor 1.00-2.80 %w/w., Caoutchouc 30.00 %w/w Ethylene Glycol Salicylate 2.00-6.00 %w/w, Eucalyptus Oil 0.50 %w/w Menthol 0.30-6.49 %w/w, Methyl Salicylate 0.14-6.00 %w/w Peppermint Oil 0.50-2.00 %w/w, Thymol 0.14-0.50 %w/w Capsaicin Extract 0.65 %w/w, Polybutene 12.00 %w/w Capsicum Powder 11.00 %w/w, Capsicum Oleoresin 3.00-11.00 %w/w และ/หรือ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/w



| สรรพคุณ                     | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน   | การเก็บรักษา                            | ขนาดบรรจุ |
|-----------------------------|---|---|---|-----------|
| ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ | เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะปิดให้สะอาดและแห้ง ปิดพลาสเตอร์ตรงบริเวณที่มีอาการปวด ควรเปลี่ยนวันละ 1-2 ครั้ง | อย่าใช้พลาสเตอร์นี้ในบริเวณเยื่อぶอ่อน ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด | เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | 10 แผ่น   |



## 6.1 ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอเฟนิรามีน

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Chlorpheniramine Maleate 2 mg.



| สรรพคุณ                             | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน  | การเก็บรักษา                           | ขนาดบรรจุ   |
|-------------------------------------|--|--|--|---|
| บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น้ำมูกไหล | รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมง<br>เมื่อมีอาการ<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 12 เม็ด<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 6 เม็ด | 1) ไม่ควรใช้ยาติดต่อกัน นานเกิน 7 วัน<br>2) ยานี้อาจทำให้เกิดอาการ ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขีเยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม | เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส | แผงพลาสติก หรือ อลูมิเนียม 6 เม็ด<br>แผงพลาสติก หรือ อลูมิเนียม 4 และ 10 เม็ด |

## 7.1 ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะ

ในสูตรตำรับ 5 มล. ประกอบด้วย

Ammonium Carbonate 0.02 g.

Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml.



| สรรพคุณ                       | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน | การเก็บรักษา   | ขนาดบรรจุ  |
|-------------------------------|--|---------|--|--|
| บรรเทา<br>อาการไอ<br>ขับเสมหะ | รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2<br>ช้อนชา (10 มิลลิลิตร)<br>เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อน<br>ชา ( 5 มิลลิลิตร)<br>เด็ก 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2<br>ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร) |         | เก็บที่<br>อุณหภูมิต่ำ<br>กว่า 40<br>องศา<br>เซลเซียส<br>และป้องกัน<br>ไม่ให้ถูก<br>แสงแดด | ขวดละ<br>60<br>มิลลิลิตร<br>และ 120<br>มิลลิลิตร |



## 7.2 ยาแก้ไอน้ำดำ

ในสูตรตำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml.

Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg.

Camphorated Opium Tincture 0.6 ml.



| สรรพคุณ                      | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน   | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ                 |
|------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| บรรเทาอาการไอและช่วยขับเสมหะ | <p>เขย่าขวดก่อนใช้</p> <p>รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง</p> <p>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มล.)</p> <p>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)</p> | <p>1) ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี คนชรา และหญิงมีครรภ์</p> <p>2) ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 3 วัน</p> <p>3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ .....% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง</p> | <p>เก็บให้พ้นมือเด็ก</p> <p>และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด</p> | <p>ขวดละ 60 มิลลิลิตร</p> |

## 8.1 ยาต้มแก้อาการวิงเวียน หน้ามืด โสมเนียบหอม

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ

Ammonium Carbonate 3.40 % W/V

Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 % V/V



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้         | คำเตือน       | การเก็บรักษา                           | ขนาดบรรจุ          |
|--|------------------------|---------------|--|--------------------|
| ดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรือ ทาผิวหนัง บรรเทาอาการเนื่องจากพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพืชมีพิษ | ใช้ชุบสำลีดม หรือใช้ทา | ห้ามรับประทาน | ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดละ 15 มิลลิลิตร |





## 8.2 ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Menthol 0.07-77.90%w/v, Camphor 0.45-42.00%w/v, Methyl Salicylate 3.00-15.00%w/v  
 Anise Oil 0.68%v/v, Burgamot Oil 0.50-0.68%v/v, Cajuput Oil 0.50-11.00 %v/v, Cassia Oil  
 0.50%w/v, Clove Oil 1.25 %v/v, Dwarf-Pine Needle Oil 1.00 %w/v, Eucalyptus Oil 1.50-  
 23.00%v/v, Lavender Oil 4.69-8.00%v/v, Peppermint Oil 2.20-10.38%v/v, Sage Oil  
 6.00%w/v, Sassafras Oil 5.00%w/v, Turpentine Oil 0.71-8.00%w/v, Capsicum Tincture 4.00-  
 8.00 %v/v, Myrrh Tincture 1.00%w/v, Ratanghia Tincture 0.40%v/v, Terpinol 3.33%v/v,  
 Thymol 0.10%w/v, Camphor Spirit 3.00%v/v, Borneo Camphor 9.00%w/v, Bornyl Acetate  
 0.42%w/v, Linalyl Acetate 0.47%w/v, Phenyl Salicylate 0.60%w/v, Standard Chamomile  
 Extract 10.00%w/v

| สรรพคุณ   | ขนาดและวิธีใช้                             | คำเตือน           | การเก็บรักษา                                   | ขนาดบรรจุ  |
|---|--|-------------------|--|--|
| บรรเทาอาการคัด<br>จมูก หายใจไม่ออก<br>และบรรเทาอาการ<br>วิงเวียนศีรษะ | ใช้สูดดม หรือทา<br>บางๆ ตามคอและ<br>หน้าอก | ห้าม<br>รับประทาน | ปิดฝาให้สนิท และ<br>ป้องกันไม่ให้ถูก<br>แสงแดด | ไม่เกิน 14 มิลลิลิตร<br>สามารถทำในรูปยา<br>สูดดมหรือยาน้ำ<br>สำหรับสูดดม |



# 29 8.3 ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดซีฟิง

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Menthol 1.35-3.00%w/w, Camphor 3.00-9.00%w/w

Cajuput Oil 3.00%w/w, Eucalyptus Oil 0.08-5.00%w/w, Turpentine Oil 4.68-5.00%w/w

| สรรพคุณ                                       | ขนาดและวิธีใช้                   | คำเตือน       | การเก็บรักษา                           | ขนาดบรรจุ       |
|---|----------------------------------|---------------|--|-----------------|
| บรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอื่นเนื่องจากหวัด | ทายาที่บริเวณลำคอ หน้าอก และหลัง | ห้ามรับประทาน | ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ไม่เกิน 50 กรัม |



# 30 9.1 ยาเม็ดแก้เมารถ เมารถเรือ ไดเมนไฮดริเนท

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Dimenhydrinate 50 mg.



| สรรพคุณ                       | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน   | การเก็บรักษา                            | ขนาดบรรจุ                            |
|-------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| ใช้ป้องกันอาการเมารถเมารถเรือ | ผู้ใหญ่รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที | ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี้นานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม | เก็บที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส | แผงพลาสติก หรือ อลูมิเนียม ละ 2 เม็ด |



## 10.1 ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ  
Sulfacetamide Sodium 10 % w/v



| สรรพคุณ   | ขนาดและวิธีใช้                                      | คำเตือน  | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ                     |
|---|---|--|---|-------------------------------|
| รักษาอาการ<br>ตาแดง ตา<br>อักเสบ จาก<br>โรคติดเชื้อ | ใช้หยอดตา<br>ครั้งละ 1-2<br>หยด วันละ 3-<br>4 ครั้ง | ห้ามใช้เมื่อเปิดใช้แล้ว<br>เกิน 1 เดือนหรือเมื่อยา<br>เปลี่ยนสี ชุ่ม หรือมี<br>ตะกอน | เก็บในที่เย็น<br>อุณหภูมิระหว่าง 8-<br>15°C และป้องกัน<br>ไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดสีชา<br>ละ 10<br>มิลลิลิตร |







## 10.2 ยาล้างตา (แก้ไขตามประกาศฉบับที่4 พ.ศ.2555)

ในสูตรตำรับประกอบด้วย Sodium Chloride

ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับยาตา ได้แก่

Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/v

หรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01 %w/v

ปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม และปรับน้ำยาให้เป็น Isotonic กับน้ำตา

| สรรพคุณ   | ขนาดและวิธีใช้              | คำเตือน       | การเก็บรักษา           | ขนาดบรรจุ                  |
|---|-----------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| ใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการ แสบตา ระคายเคืองตา อันเนื่องมาจาก ผง ควัน สิ่งสกปรกเข้าตา | ใช้ล้างตาวัดวันละ 2-3 ครั้ง | ห้ามรับประทาน | ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดละไม่เกิน 240 มิลลิลิตร |



### 11.1 ยากวาดคอ

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Potassium Iodide 2.50 g.

Iodine 1.25 g., Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml.

Purified Water 2.50 ml., Peppermint Oil 0.40 ml.,

Glycerin to 100.00 ml.



| สรรพคุณ                                 | ขนาดและวิธีใช้                                    | คำเตือน                       | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ                |
|---|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| บรรเทาอาการ<br>อักเสบ และ<br>เจ็บในลำคอ | เติมน้ำสะอาดเท่าตัว<br>แล้วใช้กวาดคอใน<br>ผู้ใหญ่ | ใช้สำหรับกวาด<br>ในคอเท่านั้น | ปิดฝาให้สนิท<br>เก็บในที่เย็น และ<br>ป้องกันไม่ให้ถูก<br>แสงแดด | ขวดละ<br>15<br>มิลลิลิตร |



# 34

## 11.2 ยารักษาเป็นฝ้า เย็นเขียมนไวโอเล็ต

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Gentian Violet 1%w/v



| สรรพคุณ                           | ขนาดและวิธีใช้                                 | คำเตือน                  | การเก็บรักษา                           | ขนาดบรรจุ                           |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| รักษากระพุ้งแก้มและลิ้นเป็นฝ้าขาว | ใช้สำลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง | ใช้สำหรับทาในปากเท่านั้น | เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส | ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร |



### 11.3 ยาแก้ปวดฟัน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Chlorobutanol 25g.

Clove Oil to 100 ml.



| สรรพคุณ           | ขนาดและวิธีใช้                             | คำเตือน  | การเก็บรักษา                                | ขนาดบรรจุ         |
|-------------------|--|--|---|-------------------|
| บรรเทาอาการปวดฟัน | ใช้ไม้เล็กๆ พันสำลีชุบยาอุดฟันตรงที่เป็นรู | 1) ระวังอย่าให้ถูกบริเวณอื่น<br>2) ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาทันตแพทย์ | เก็บให้พ้นมือเด็ก และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดละ 8 มิลลิลิตร |





## 11.4 ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาลำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Abietis Pine Oil 0.30%v/w, Anise Oil 0.25%w/w, Borneol 1.66-2.00%w/w, Cinnamon Oil 0.35%w/w, Creosote 0.20%v/w, Eucalyptus Oil 0.15-0.16%w/w, Lemon Oil 0.30-0.52%v/w, Menthol 0.06-5.00%w/w, Peppermint Oil 0.19-3.33%w/w, Sylvestris Pine Oil 0.30%v/w, Licorice Extract 7.31-16.67%w/w, Tincture Capsicum 0.02%w/w, Amomum 1.00-4.00%w/w, Aniseed 2.00%w/w, Catechu 8.33-38.00%w/w, Cinnamon 2.00-10.00%w/w, Clove 0.67-4.00%w/w, Costus 0.67%w/w, Fennel 1.67-2.00%w/w, Ginger 2.00-8.00%w/w, Licorice 26.67-71.38%w/w, Saffron 2.00%w/w, Saussurea 1.00-3.00%w/w, Silver Leaf 0.93%w/w, และ/หรือ Honey 1.50-2.40%w/w

| สรรพคุณ                        | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน | การเก็บรักษา         | ขนาดบรรจุ                             |
|--------------------------------|--|---------|----------------------|---------------------------------------|
| ทำให้ชุ่มคอ บรรเทาอาการระคายคอ | ใช้อมให้ละลายช้าๆ ครั้งละ 1-5 เม็ด (โดยให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาตำรับยา แผนปัจจุบัน ที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณา ตามขนาดที่ถูกต้อง ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา) |         | เก็บในที่แห้งและเย็น | ไม่เกิน 100 เม็ด หรือ ไม่เกิน 30 กรัม |





## 11.5 ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ

(เพิ่มเติมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ ๒๕๔๙ )

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg., 2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg., และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg.

| สรรพคุณ           | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน   | การเก็บรักษา                     | ขนาดบรรจุ                                       |
|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
| บรรเทาอาการเจ็บคอ | ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป อมครั้งละ 1 เม็ดให้ละลายช้าๆ ในปากทุก 2-3 ชั่วโมง (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์ที่เป็นยาสามัญพิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา) | 1) หากใช้ติดต่อกัน 2 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร<br>2) หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา<br>3) ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี | เก็บยาในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C | แผงอลูมิเนียมหรือแผงพลาสติกแต่ละไม่เกิ น 8 เม็ด |



## 12.1 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Iodine 2.0-2.5 %w/v

Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v

| สรรพคุณ        | ขนาด<br>และวิธีใช้                    | คำเตือน   | การเก็บรักษา   | ขนาด<br>บรรจุ                    |
|----------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| รักษา<br>แผลสด | ใช้สำลี<br>สะอาด<br>ชุบยาทา<br>ที่แผล | 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือ<br>ผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา<br>2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา | ปิดฝาให้สนิท<br>และเก็บในที่<br>อุณหภูมิต่ำกว่า<br>40 °C | ขวดละ<br>15 มล.<br>และ 30<br>มล. |





## 12.2 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอล

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Thimerosal 0.1 % w/v

| สรรพคุณ     | ขนาดและวิธีใช้            | คำเตือน  | การเก็บรักษา                                  | ขนาดบรรจุ               |
|-------------|---------------------------|--|---|-------------------------|
| รักษาบาดแผล | ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล | 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา<br>2) หลีกเลียงอย่าให้ยาเข้าตา | ปิดฝาให้สนิทและเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 °C | ขวดละ 15 มล. และ 30 มล. |





## 12.3 ยาใส่แผล โปวิดอน-ไอโอดีน

(แก้ไขตามประกาศฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Povidone-Iodine 10 % w/v equivalent to Iodine 1 % w/v

| สรรพคุณ    | ขนาดและวิธีใช้            | คำเตือน  | การเก็บรักษา                                  | ขนาดบรรจุ            |
|------------|---------------------------|--|---|----------------------|
| รักษาแผลสด | ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล | 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา<br>2) หลีกเลียงอย่าให้ยาเข้าตา | ปิดฝาให้สนิทและเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 °C | ขวดละไม่เกิน 120 มล. |





## 12.4 ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์

(แก้ไขตามประกาศฉบับที่4 พ.ศ.2555)

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Isopropyl Alcohol Solution 70 % v/v

โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090

| สรรพคุณ           | ขนาดและวิธีใช้       | คำเตือน       | การเก็บรักษา                           | ขนาดบรรจุ            |
|-------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|
| ทำความสะอาดบาดแผล | ใช้ทำความสะอาดบาดแผล | ห้ามรับประทาน | ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดละไม่เกิน 450 มล. |



## 12.5 ยาเอทิล แอลกอฮอล์

(แก้ไขตามประกาศฉบับที่4 พ.ศ.2555)

ในสูตรตำรับประกอบด้วย Ethyl Alcohol Solution 70 % v/v

โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090



| สรรพคุณ     | ขนาดและวิธีใช้ | คำเตือน       | การเก็บรักษา                           | ขนาดบรรจุ            |
|-------------|----------------|---------------|--|----------------------|
| ทำความสะอาด | ใช้ทำความสะอาด | ห้ามรับประทาน | ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดละไม่เกิน 450 มล. |
| สะอาด       | สะอาดรอบ       |               |  |                      |
| บาดแผล      | บาดแผล         |               |  |                      |

## 12.6 น้ำเกลือล้างแผล

(แก้ไขตามประกาศฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Chloride 0.9 % w/v



| สรรพคุณ           | ขนาดและวิธีใช้          | คำเตือน | การเก็บรักษา                             | ขนาดบรรจุ            |
|-------------------|-------------------------|---------|--|----------------------|
| ทำความสะอาดบาดแผล | ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล |         | เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส | ขวดละ ไม่เกิน 1 ลิตร |

## 12.7 น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล

(เพิ่มตามประกาศฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Chloroxylenol ร้อยละ 4.8 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร

Isopropyl alcohol solution ร้อยละ 12 โดยปริมาตร



| สรรพคุณ                               | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน           | การเก็บรักษา | ขนาดบรรจุ                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------|
| ใช้ทำความสะอาด<br>สะเก็ดรอบ<br>บาดแผล | ห้ามใส่แผลโดยตรง<br>เจือจางน้ำยา 1 ส่วนกับ<br>น้ำ 19 ส่วน ใช้เช็ดทำ<br>ความสะอาดรอบ<br>บาดแผล | ห้าม<br>รับประทาน | ปิดฝาให้สนิท | ขวดละ<br>ไม่เกิน<br>450 มล. |

## 13.1 ยารักษาแผลน้ำร้อนลวกฟีนอล

(ยากลุ่มตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549)

ในสูตรตำรับประกอบด้วย Phenol 1g., Arachis Oil 50ml., Calcium Hydroxide Solution to 100 ml.


| สรรพคุณ                   | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน       | การเก็บรักษา           | ขนาดบรรจุ               |
|---------------------------|--|---------------|------------------------|-------------------------|
| รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก | เชย่ำขวดก่อนใช้ยา ใช้สำลีชุบยานี้ทาปิดให้ทั่วบริเวณที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก เปลี่ยนยาวันละ 2-3 ครั้ง | ห้ามรับประทาน | ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดละ 30 มล. และ 60 มล. |



## 13.2 ยารักษาแผลติดเชื้อ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอานีน ครีม

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Silver Sulfadiazine 1% w/w



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน   | การเก็บรักษา                      | ขนาดบรรจุ                         |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ใช้ทาภายนอกเพื่อรักษาการติดเชื้อของแผลซึ่งเกิดจากไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก | ใช้ทาบริเวณแผลที่เป็น ควรทำความสะอาดแผล แล้วทาครีมทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง (สำหรับแผลที่ถูกไฟไหม้ ควรใช้ครีมทุก 24 ชั่วโมง) | 1) ไม่ควรใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ และทารกแรกเกิด (1 เดือนแรก)<br>2) ในคนที่แพ้ยา Sulphonamide<br>3) ในผู้ที่ เป็นโรคตับ และโรคไต | เก็บในที่อุณหภูมิระหว่าง 15-30 °C | หลอดละ 5 กรัม 15 กรัม และ 25 กรัม |



## 14.1 ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Methyl Salicylate 1.14-50.00%w/w, Camphor 1.76-25.00%w/w

Menthol 3.00-20.00%w/w, Cinnamon Oil 1.00-2.40%w/w

Clove Oil 0.50-5.00%v/w, Eucalyptus Oil 1.50-13.70%v/w

Peppermint Oil 0.70-16.00%w/w, Turpentine Oil 2.00-3.80%v/w

Capsicum Tincture 0.80-8.00%v/v, Colophony 2.51%v/w

| สรรพคุณ   | ขนาด<br>และวิธีใช้                   | คำเตือน       | การเก็บรักษา                                  | ขนาด<br>บรรจุ      |
|---|--------------------------------------|---------------|---|--------------------|
| บรรเทาอาการปวด บวม<br>อักเสบ เนื่องจากแมลงกัด<br>ต่อย หรือปวดเมื่อย<br>กล้ามเนื้อ | ทาและ<br>นวด<br>บริเวณที่<br>มีอาการ | ห้ามรับประทาน | ปิดฝาให้สนิท<br>และป้องกันไม่ให้<br>ถูกแสงแดด | ไม่เกิน<br>30 กรัม |

# 15.1 ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต



ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Benzyl Benzoate 25 % w/v

| สรรพคุณ           | ขนาดและวิธีใช้  | ค่าเดือน             | การเก็บรักษา   | ขนาดบรรจุ                 |
|-------------------|---|----------------------|--|---------------------------|
| รักษาหิดเหาและโลน | <p>เขย่าขวดก่อนใช้ยา สำหรับเด็กเล็กให้แบ่งยา มาเติมน้ำเท่าตัว แล้วผสมให้เข้ากัน</p> <p><b>-สำหรับรักษาหิด</b></p> <p>อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน แล้วทายานี้ให้ทั่วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นให้ทาซ้ำใหม่อีกครั้ง ตามวิธีเดิม</p> <p><b>-สำหรับรักษาเหาและโลน</b></p> <p>ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณ ที่มีเหาหรือโลน ทิ้งไว้ 1 วัน ถ้าเป็นมากให้ใช้ยา 2 ครั้งต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมื่อครบ 7 วันให้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่หาย ให้ใส่ยาซ้ำตามวิธีเดิม</p> | ระวังอย่าให้ยาเข้าตา | เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดสีชา 30 มล. และ 60 มล. |

## 15.2 ยารักษาโรค ขี้ผึ้งกำมะถัน

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sublimed Sulphur 10 % w/w



| สรรพคุณ         | ขนาดและวิธีใช้                               | คำเตือน  | การเก็บรักษา                           | ขนาดบรรจุ                          |
|-----------------|--|--|--|------------------------------------|
| รักษาโรค<br>หิด | ใช้ทาบริเวณที่เป็น<br>หิด วันละ 2-3<br>ครั้ง | ถ้าเกิดอาการระคายเคือง<br>ต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา | เก็บในที่<br>อุณหภูมิต่ำ<br>กว่า 40 °C | หลอดละ<br>5 กรัม<br>และ 15<br>กรัม |



### 15.3 ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Benzoic Acid 2.5-6.5 %w/w

Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w

| สรรพคุณ                            | ขนาดและวิธีใช้                        | คำเตือน                                      | การเก็บรักษา                   | ขนาดบรรจุ                 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| รักษา กลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า | ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง | ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา | เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 °C | หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม |



## 15.4 ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Coal Tar 1 % w/w



| สรรพคุณ   | ขนาดและวิธีใช้                        | คำเตือน                                      | การเก็บรักษา                   | ขนาดบรรจุ                        |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังบางชนิด เช่น เรื้อนกวาง ผิวหนังเป็นผื่นคัน | ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง | ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา | เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 °C | หลอดหรือขวดละ 5 กรัม และ 15 กรัม |

## 15.5 ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์

(แก้ไขตามประกาศฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Calamine 8-15 %w/v

Zinc Oxide 3-12 %w/v



| สรรพคุณ                                | ขนาดและวิธีใช้                                  | คำเตือน       | การเก็บรักษา           | ขนาดบรรจุ            |
|--|---|---------------|------------------------|----------------------|
| บรรเทาอาการคันเนื่องจากผดผื่นคัน ลมพิษ | เชย่ำขวดก่อนใช้ยาทาบริเวณที่เป็นวันละ 3-4 ครั้ง | ห้ามรับประทาน | ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดละไม่เกิน 180 มล. |





## 15.6 ยารักษาเกื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Thiosulfate 100 %w/w



| สรรพคุณ     | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน                           | การเก็บรักษา           | ขนาดบรรจุ                                   |
|-------------|--|-----------------------------------|------------------------|---|
| รักษาเกื้อน | เติมน้ำสะอาดจนถึงคอขวด เขย่าผสมกัน จนตัวยาละลายหมด (จะได้ความเข้มข้นประมาณ 25%) ใช้ทาบริเวณที่เป็นเกื้อน หลังอาบน้ำ วันละหลายครั้ง | ยาที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ภายใน 15 วัน | ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดละ 15 กรัม สำหรับผสมน้ำเป็น 60 มิลลิลิตร |

## 16.1 ยาเม็ดวิตามินบีรวม

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 5 mg.

Pyridoxine Hydrochloride 2 mg., Riboflavine 2 mg., Nicotinamide 20 mg.



| สรรพคุณ                                | ขนาดและวิธีใช้  | คำเตือน | การเก็บรักษา                                    | ขนาดบรรจุ                                 |
|--|---|---------|---|---|
| ป้องกันการขาดวิตามินบี และบำรุงร่างกาย | รับประทานวันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด |         | เก็บในที่แห้ง และเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | แผงพลาสติก หรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด |

## 16.2 ยาเม็ดวิตามินซี

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ascorbic Acid 100 mg.



| สรรพคุณ                        | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน                         | การเก็บรักษา  | ขนาดบรรจุ   |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|---|
| ป้องกัน<br>การขาด<br>วิตามินซี | รับประทานวันละ 1 ครั้ง<br>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ<br>2 เม็ด<br>เด็ก 6-12 ปี รับประทาน<br>ครั้งละ 1 เม็ด | ห้ามใช้เมื่อเม็ด<br>ยาเปลี่ยนสี | เก็บในที่<br>อุณหภูมิต่ำกว่า<br>40 องศา<br>เซลเซียส และ<br>ป้องกันไม่ให้ถูก<br>แสงแดด | แผง<br>พลาสติก<br>หรือ<br>อลูมิเนียม<br>มละ 4<br>และ 10<br>เม็ด |

## 16.3 ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอรัส ซัลเฟต

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ  
Ferrous Sulfate Equivalent to Iron 60 mg.



| สรรพคุณ  | ขนาดและวิธีใช้                                    | คำเตือน  | การเก็บรักษา                             | ขนาดบรรจุ                                |
|--|---|--|--|--|
| รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่ | รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร | 1) ในช่วงรับประทานยา อูจจะจะมีสีดำ<br>2) หากเกิดอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้ ควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือค่อยๆเพิ่มขนาดของยาจนถึงขนาดที่แนะนำให้ใช้ | เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส | แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด |

## 16.4 ยาเม็ดวิตามินรวม

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Vitamin A 2,500 I.U., Vitamin D 300 I.U.,

Vitamin C 15.00 mg.

Vitamin B1 Mononitrate 1.00 mg., Vitamin B2 0.50 mg., Nicotinamide 7.50 mg.



| สรรพคุณ   | ขนาดและวิธีใช้               | คำเตือน   | การเก็บรักษา   | ขนาดบรรจุ  |
|---|------------------------------|---|--|--|
| ป้องกัน<br>การขาด<br>วิตามิน<br>สำหรับ<br>ผู้ใหญ่ | รับประทาน<br>วันละ 1<br>เม็ด | ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนด ไว้หรือใช้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลาเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง | เก็บในที่<br>แห้งและ<br>เย็น และ<br>ป้องกัน<br>ไม่ให้ถูก<br>แสงแดด | แผงพลาสติก<br>หรือ<br>อลูมิเนียมละ<br>4 และ 10<br>เม็ด |

## 16.5 น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล

ในสูตรตำรับ 1 แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Cod Liver Oil equivalent to Vitamin A ไม่เกิน 4,000 IU, Vitamin D ไม่เกิน 300 IU.



| สรรพคุณ                                 | ขนาดและวิธีใช้                          | คำเตือน   | การเก็บรักษา   | ขนาดบรรจุ   |
|---|---|---|--|---|
| ป้องกัน<br>การขาด<br>วิตามิน A<br>และ D | ผู้ใหญ่<br>รับประทาน<br>วันละ 1<br>เม็ด | ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดไว้หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง | เก็บในที่แห้ง<br>และเย็น และ<br>ป้องกันไม่ให้<br>ถูกแสงแดด | แผง<br>พลาสติก<br>หรือ<br>อลูมิเนียม<br>มละ 4<br>และ 10<br>เม็ด |



## 16.6 น้ำมันตับปลาชนิดน้ำ

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Cod Liver Oil equivalent to Vitamin A ไม่เกิน 4,000 IU.

Vitamin D ไม่เกิน 300 IU.

| สรรพคุณ                      | ขนาดและวิธีใช้   | คำเตือน  | การเก็บรักษา                                      | ขนาดบรรจุ   |
|------------------------------|--|--|---|---|
| ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D | เขย่าขวดก่อนใช้<br>เด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป<br>รับประทานวันละ 1 ช้อนชา<br>เด็กอายุ 1-4 ปี รับประทานวันละ 1/2 ช้อนชา<br>เด็กแรกเกิด -1 ปี รับประทานวันละ 1/4 ช้อนชา | ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนด<br>ไว้หรือใช้ติดต่อกัน<br>เป็นระยะเวลา<br>นานนอกจากแพทย์สั่ง | เก็บในที่แห้งและเย็น<br>และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด | ขวดละ 120 มิลลิลิตร<br>240 มิลลิลิตร<br>และ 400 มิลลิลิตร |



# คำแนะนำพิเศษ

## ○ ยาที่ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

- ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม
- ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไซเมทิโคน
- ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมทิโคน
- ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล

## ○ รับประทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ

- ยาเม็ด และยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม
- ยาเม็ดและยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไซเมทิโคน

## ○ รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง

- ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซดามินท์



## ○ ยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคไต, ยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ

- ยาเม็ดและยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม
- ยาเม็ดยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไซเมทิโคน
- ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์
- ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง
- ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
- ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต

## ○ ยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

- ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต

## ○ ไม่ควรใช้เป็นประจำ

- ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับเด็ก/สำหรับผู้ใหญ่
- ยาระบายแมกนีเซียม
- ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร



- **ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด**
  - ยาขับลม
  - ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
  - ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์
  - ยากวาดคอ
- **เขย่าขวดก่อนใช้ยา**
  - ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม
  - ยาขับลม
  - ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง
  - ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไซเมทิโคน
  - ยาระบายแมกนีเซียม
  - ยาแก้ไอน้ำดำ
  - ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต
  - ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์
- **ยาที่สามารถใช้ในเด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป**
  - ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
- **ใช้ทาบาง ๆ ที่หน้าท้อง**
  - ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์



## ○ ยาที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่

- ยาขับลม
- ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง
- ยาแก้ไอน้ำดำ

## ○ รับประทานก่อนอาหาร

- ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง

## ○ ห้ามรับประทาน

- ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์

## ○ หากต้องรับประทานร่วมกับยาอื่น ควรห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

- ยาเม็ด และยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไฮโดรอกไซด์
- ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย

## ○ เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

- ยาเม็ดและยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไฮโดรอกไซด์
- ยาผงฟูซิทริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต
- ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย
- ยาระบายมะขามแขก
- ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ



- **ผสมน้ำก่อนแก้วรับประทาน หลังหมดฟองฟู**
  - ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต
- **ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์**
  - ยาเม็ดชะงายน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม
  - ยาเม็ดและชาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไซเมทิโคน
  - ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์
  - ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง
  - ชาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
  - ยาผงฟูซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต
- **หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**
  - ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมทิโคน (3 วันหลังการใช้ยา)
  - ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย (2-3 วันหลังใช้ยา)
  - ยาแก้ไอน้ำดำ (3 วันหลังการใช้ยา)
  - ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ( 2 วันหลังใช้ยา)
- **รับประทานยาแล้วอาจทำให้อุจจาระมีสีค่อนข้างดำ**
  - ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย
  - ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอรัส ซัลเฟต



## ○ ต้องเก็บยาในตู้เย็น

- ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่
- ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์

## ○ เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส

- ยาระบายแมกนีเซียม

## ○ ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน 7 วัน

- ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน

## ○ ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม

- ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน
- ยาเม็ดแก้เมารถ เมารถเรือ ไดเมนไฮดริเนท

## ○ ห้ามใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี หญิงตั้งครรภ์ คนชรา

- ยาแก้ไอน้ำดำ
- ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ

## ○ ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด

- ยารักษาแผลติดเชื้อ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดออกไซด์ ครีม

