

1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

ชื่อยา	ตำรับยา	วิธีใช้			สรรพคุณ			ห้ามใช้ในผู้ป่วย		ห้ามทานเกิน	มี alcohol
					จุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ	มีแผลใน กระเพาะ อาหาร/ลำไส้	ขับ ลม	ไต	หัวใจ		
1. ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม	Aluminium Hydroxide Magnesium Hydroxide	เคี้ยวยาก่อน กลืน	ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-4 เม็ด เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 เม็ด	ก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือ หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ เมื่อมีอาการ	√	√	-	√	√	2 wks	-
2. ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม	Aluminium Hydroxide Magnesium Hydroxide	เขย่าขวดก่อน ใช้	ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-4 ช้อนชา เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 1-2 ช้อนชา เด็ก 3-6 ปี ครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา	รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือ หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ เมื่อมีอาการ	√	√	-	√	√	2 wks	-
3. ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซตามินท์	Sodium Bicarbonate Peppermint Oil	-	ผู้ใหญ่ ครั้งละ 3-6 เม็ด เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 1-3 เม็ด	หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ เมื่อมีอาการ	√	-		√	-	2 wks	-
4. ยาขับลม		เขย่าขวดก่อน ใช้	ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ	วันละ 3-4 ครั้ง	√	-	√	-	-	-	√
5. ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำ แดง		เขย่าขวดก่อน ใช้	ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ	อาหารวันละ 3 ครั้ง	√	-		√	√	2 wks	√
6. ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมโบ คาร์บอเนต		-	เด็กอายุ 2-3 ปี ครั้งละ 2-3 ช้อนชา เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 2 ช้อน ชา เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช้อน ชา	หลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควรให้เกินวันละ 6 ครั้ง	√	-		√	√	2 wks	-

1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ (ต่อ)

ชื่อยา	ตำรับยา	วิธีใช้			สรรพคุณ			ห้ามใช้ในผู้ป่วย			ห้ามทานเกิน	มี alcohol
					จุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ	มีกรดมาก มีผลใน กระเพาะ อาหาร/ลำไส้	ขับลม	ไต	หัวใจ	ความดันโลหิตสูง		
7. ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์ มหาหิงคุ์	Asafetida	ทาบางๆ ที่ หน้าท้อง	เด็ก	วันละ 2-3 ครั้ง	√	-	√	-	-	-	-	-
8. ยาเม็ดลดกรด อะลูมิ นา-แมกนีเซียม-ไซเมธิ โคน	Aluminium Hydroxide Magnesium Hydroxide Simethicone	เคี้ยวยาก่อนกลืน	ผู้ใหญ่ ละ 1 - 4 เม็ด เด็กอายุ 6 - 12 ปี ครั้งละ 1 - 2 เม็ด	ก่อนอาหาร ครั้งชั่วโมง หรือ หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ เมื่อมีอาการ ควรรับประทานห่างยาอื่น 2 ชั่วโมง	√	√	√	√	√	-	2 wks	-
9. ยาน้ำลดกรด อะลูมิ นา-แมกนีเซียม-ไซเมธิ โคน	Aluminium Hydroxide Magnesium Hydroxide Simethicone	เขย่าขวดก่อน ใช้	ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 - 4 ซ้อนชา เด็กอายุ 6 - 12 ปี ครั้งละ 1 - 2 ซ้อนชา	ก่อนอาหาร ครั้งชั่วโมง หรือ หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ เมื่อมีอาการ ควรรับประทานห่างยาอื่น 2 ชั่วโมง	√	√	√	√	√	-	2 wks	-
10. ยาผงฟูซิทริกแอซิด- โซเดียมไบ คาร์บอเนต-โซเดียม คาร์บอเนต	Citric acid anhydrous Sodium bicarbonate Sodium carbonate	ผสมน้ำก่อนแก้ว รับประทาน หลัง หมดฟองฟู	ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ครั้งละ 1 ของ	ครั้งละ 1 ของ รับประทานซ้ำได้ อีกภายใน 2 หรือ 3 ชั่วโมง ถ้า ต้องการ	√	-	-	√	√	√	2 wks	-
11. ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมธิโคน	Simethicone	เคี้ยวก่อนกลืน	ขนาด 40 มิลลิกรัม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการ ขนาด 80 มิลลิกรัม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เมื่อมีอาการ	วันละ 4 ครั้ง (ไม่เกินวันละ 12 เม็ด) วันละ 4 ครั้ง (ไม่เกินวันละ 6 เม็ด)	√	-	-	-	-	-	3 d	-

2. ยาแก้ท้องเสีย

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้	ข้อห้ามใช้			อาการที่ควรพบแพทย์	อื่นๆ
				โรคไต	โรคหัวใจ	ร่วมกับยาอื่น		
1. ยาแก้ท้องเสีย น้ำตาลเกลือแร่ ผง	Sodium Chloride Sodium Bicarbonate Potassium Chloride Glucose - Anhydrous	ทดแทนการเสียน้ำ และป้องกันการช็อคจากการขาดน้ำ	เทพงยาทั้งซองละลายในน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว ประมาณ 250 มิลลิลิตร (1 แก้ว) ให้ดื่มมากๆ เมื่อเริ่มมีอาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบ่อยให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียนด้วยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง เด็กอายุมากกว่า 2 ปี-ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ประมาณ 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) ต่อการถ่ายอุจจาระ 1 ครั้ง หรือตามความกระหายของผู้ป่วย เด็กอ่อน-เด็กอายุ 2 ปี ให้ดื่มทีละน้อยสลับกับน้ำเปล่าประมาณวันละ 4 ชองหรือมากกว่าที่คนไข้ต้องการและดื่มต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น	√	√	√	อาเจียนมาก เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป หรือหมดสติ	ยาที่ละลายน้ำแล้ว เก็บ 24 ชั่วโมง ไม่ควรใช้
2. ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย	Activated charcoal	รักษาอาการท้องเสีย	ผู้ใหญ่ และเด็ก อายุมากกว่า 2 ปี รับประทาน ครั้งละ 3 - 4 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง			√	อาการท้องเสียยังไม่ดีขึ้น ภายใน 2 - 3 วัน	อุจจาระอาจมีสีดำ

3. ยาระบาย

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้	ไม่ควรใช้เป็นประจำ	เก็บในตู้เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้อง หรือคลื่นไส้อาเจียน	หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
1.ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับเด็ก	Glycerin 91 % w/w แท่งละ 1.5 กรัม	บรรเทาอาการท้องผูก	ใช้เมื่อต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที เพื่อให้ตัวยาละลายเหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง	√	√	-	-
2. ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับผู้ใหญ่	Glycerin 91 % w/w แท่งละ 2.55 กรัม	บรรเทาอาการท้องผูก	ใช้เมื่อต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที เพื่อให้ตัวยาละลายเหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง	√	√	-	-
3.ยาระบายแมกนีเซีย	Magnesium Hydroxide	ยาระบาย	เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2-3 ซ้อนโต๊ะ เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ซ้อนโต๊ะ เด็ก 1-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 ซ้อนชา	√	-	√	-
4.ยาระบายมะขามแขก	Sennosides	ยาระบาย	รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-4 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด	√	-	-	√
5.ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร	Sodium Chloride 15 % w/v	บรรเทาอาการท้องผูก	สวนเข้าทางทวารหนัก แล้วกลั้วไว้จนทนไว้ โหวจึงเข้าส้วม ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ 20-40 มิลลิลิตร เด็ก 6-12 ปี ใช้ครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร เด็ก 1-6 ปี ใช้ครั้งละ 5-10 มิลลิลิตร	√	-	-	-

4. ยาถ่ายพยาธิ

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	สำหรับพยาธิ		คำเตือน
			เส้นด้ายและเข็มหมุด	สำหรับพยาธิตัวกลมอื่นๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน และพยาธิแส้ม้า	
1.ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล	Mebendazole	เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน	1 เม็ด หลังอาหารเย็นเพียงครั้งเดียว	ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน 3 วัน และอาจรับประทานซ้ำอีก 1 เม็ด หลังจากการรักษาครั้งแรก 2 สัปดาห์ต่อมา	1) ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก และผู้ที่เป็นโรคตับ 2) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

5. ยาบรรเทาปวดลดไข้

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้	ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน	ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้	อื่นๆ
1.ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มก.	Paracetamol	ลดไข้ บรรเทาอาการปวด	รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรเกินวันละ 4 ครั้ง ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-2 เม็ด เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 1/2-1 เม็ด	√	√	-
2.ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 325 มก.	Paracetamol	ลดไข้ บรรเทาอาการปวด	รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรเกินวันละ 5 ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด	√	√	-
3.ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล	Paracetamol 120 mg/5 ml	ลดไข้ บรรเทาอาการปวด	- ขนาด 60 มิลลิกรัม เด็กอายุ 3-6 ปี ครั้งละ 1-2 ช้อนชา เด็กอายุ 1-3 ปี ครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา เด็กอายุ 6 เดือน-1 ปี ครั้งละ 1/2 ช้อนชา - ขนาด 30 มิลลิกรัม เด็กอายุ 4-5 เดือน ครั้งละ 2 หลอดหยด (2.4 มล.) เด็กอายุ 2-3 เดือน ครั้งละ 1/2 หลอดหยด (1.8 มล.) เด็กแรกเกิด -1 เดือน ครั้งละ 1 หลอดหยด (1.2 มล.)	√	√	
4.พลาสเตอร์บรรเทาปวด		บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ	เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะปิดให้สะอาดและแห้ง ปิดพลาสเตอร์ตรงบริเวณที่มีอาการปวด ควรเปลี่ยนวันละ 1-2 ครั้ง	-	-	อย่าใช้บริเวณเยื่อปูดอน ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด

6. ยาแก้แพ้

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้	ห้ามใช้นานเกิน 7 วัน	ยาจะทำให้ง่วงซึม
1.ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน	Chlorpheniramine Maleate	บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น้ำมูกไหล	รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่เกินวันละ 12 เม็ด เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 1 เม็ด ไม่เกินวันละ 6 เม็ด	√	√

7. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้	ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี คนชรา และหญิงมีครรภ์	ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกัน นานเกิน 3 วัน	ยา มี alcohol
1.ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะสำหรับเด็ก	Ammonium Carbonate Glycyrrhiza Fluidextract	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ	วันละ 3-4 ครั้ง เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 2 ช้อนชา เด็ก 3-6 ปี ครั้งละ 1 ช้อนชา เด็ก 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา	-	-	-
2.ยาแก้ไอ น้ำคำ	Glycyrrhiza Fluidextract Antimony Potassium Tartrate Camphorated Opium Tincture	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ	เขย่าขวดก่อนใช้ วันละ 3-4 ครั้ง ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-2 ช้อนชา เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนชา	√	√	√

8. ยาตมหรือทาแก้วิ่งเวียน หน้ามืด คัดจุมุก

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้
1.ยาตมแก้วิ่งเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม	Ammonium Carbonate Strong Ammonia Solution	บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด บรรเทาอาการเนื่องจากพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพิษมีพิษ	ดม ทาผิวหนัง
2.ยาตมแก้วิ่งเวียน แก้วัดจุมุก		บรรเทาอาการคัดจุมุก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ	ใช้สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก
3.ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจุมุกชนิดขี้ผึ้ง		บรรเทาอาการคัดจุมุกและลดอาการอันเนื่องจากหวัด	ทายาที่บริเวณลำคอ หน้าอกและหลัง

9. ยาแก้เมารถ เมาเรือ

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้	คำเตือน
1.ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ โดเมนไฮดริเนท	Dimenhydrinate	ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ	ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที	ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม

10. ยาสำหรับโรคตา

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้	คำเตือน
1.ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์	Sulfacetamide Sodium 10 % w/v	รักษาอาการตาแดง ตาอักเสบ จากโรคติดเชื้อ	หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง	ห้ามใช้เมื่อเปิดใช้แล้วเกิน 1 เดือนหรือเมื่อยาเปลี่ยนสี ขุ่น หรือมีตะกอน
2.ยาล้างตา	ใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา อันเนื่องมาจาก มง ควัน สิ่งสกปรกเข้าตา		ใช้ล้างตวันละ 2-3 ครั้ง	

11. ยาสำหรับโรคปากและลำคอ

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้	คำเตือน
1.ยากวาดคอ		บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ	เติมน้ำสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอในผู้ใหญ่	-
2.ยารักษาเส้นเป็นฝ้า เยนไวโอเลตเขียน	Gentian Violet 1%w/v	รักษากระพุ้งแก้มและลิ้นเป็นฝ้าขาว	ใช้สำลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง	-
3.ยาแก้ปวดฟัน	Chlorobutanol Clove Oil	บรรเทาอาการปวดฟัน	ใช้ไม้เล็ก ๆ พันสำลีชุบยาอุดฟันตรงที่เป็นรู	1) ระงับยาให้ถูกบริเวณอื่น 2) ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาทันตแพทย์

12. ยาใส่แผล ล้างแผล

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้	คำเตือน
1.ยาใส่แผล หิงเจอร์ไอโอดีน		รักษาแผลสด	ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล	1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
2.ยาใส่แผล หิงเจอร์โทเมอร์ซอล	Thimerosal 0.1 % w/v	รักษาบาดแผล	ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล	1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
3.ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน		รักษาแผลสด	ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล	1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา 2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
4.ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์		ทำความสะอาดบาดแผล	ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล	ห้ามรับประทาน
5.ยาเอทิล แอลกอฮอล์	Ethyl Alcohol Solution 70 % v/v แต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090	ทำความสะอาดบาดแผล	ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล	
6.น้ำเกลือล้างแผล	Sodium Chloride 0.9 % w/v			
7.น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคลอโรโซลินอล	Chloroxylenol Isopropyl alcohol solution	ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล	ห้ามใส่แผลโดยตรง เจือจางน้ำยา 1 ส่วนกับน้ำ 19 ส่วน ใช้เช็ดทำความสะอาดรอบบาดแผล	

13. ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	วิธีใช้	คำเตือน
1.ยารักษาแผลติดเชื้อ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม	Silver Sulfadiazine 1% w/w	ใช้ทาภายนอกเพื่อรักษาการติดเชื้อของแผล ซึ่งเกิดจากไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก	ใช้ทาบริเวณแผลที่เป็น ควรทำความสะอาดแผล แล้วทาครีมทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง (สำหรับแผลที่ถูกไฟไหม้ ควรใช้ครีมทุก 24 ชั่วโมง)	1) ไม่ควรใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ และทารกแรกเกิด (1 เดือนแรก) 2) ในคนที่แพ้ยา Sulphonamide 3) ในผู้ที่เป็นโรคตับและโรคไต

14. ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แผลงัดต่อ

ชื่อยา	สรรพคุณ	วิธีใช้
1.ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง	บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ เนื่องจากแผลงัดต่อ หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	ทาและนวดบริเวณที่มีอาการ

15. ยาสำหรับโรคผิวหนัง

ชื่อยา	ตำรับยา	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน
1.ยารักษาหิด เบนซิล เบนโซเอต	Benzyl Benzoate 25 % w/v	รักษาหิด เหา และโลน	เขย่าขวดก่อนใช้ยา สำหรับเด็กเล็กให้แบ่งยา มาเติมน้ำเท่าตัว แล้วผสมให้เข้ากัน -สำหรับรักษาหิด อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน แล้วทายานี้ให้ทั่ว ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นให้ทาซ้ำใหม่อีกครั้ง ตามวิธีเดิม -สำหรับรักษาเหาและโลน ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณ ที่มีเหาหรือโลน ทิ้งไว้ 1 วัน ถ้าเป็นมากให้ใช้ยา 2 ครั้งต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมื่อครบ 7 วันให้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายัง ไม่หาย ให้ใส่ยาซ้ำตามวิธีเดิม	ระวังอย่าให้ยาเข้าตา
2.ยารักษาหิด ซัลฟิวร์กัมมะถัน	Sublimed Sulphur 10 % w/w	รักษาโรคหิด	ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิด วันละ 2-3 ครั้ง	ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อ ผิวหนังให้หยุดใช้ยา
3.ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า	Benzoic Acid 2.5-6.5 %w/w Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w	รักษากลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า	ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง	ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อ ผิวหนังให้หยุดใช้ยา
4.ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง	Coal Tar 1 % w/w	รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังบางชนิด เช่น เรื้อนกว้าง ผิวหนังเป็นผื่นคัน	ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง	ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อ ผิวหนังให้หยุดใช้ยา
5.ยาทาแก้ผื่นคัน คาลาไมน์	Calamine 8-15 %w/v Zinc Oxide 3-12 %w/v	บรรเทาอาการคันเนื่องจากผื่นคัน ลมพิษ	เขย่าขวดก่อนใช้ยา ทาบริเวณที่เป็นวันละ 3-4 ครั้ง	ห้ามรับประทาน
6.ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต	Sodium Thiosulfate 100 %w/w	รักษาเกลื้อน	เติมน้ำสะอาดจนถึงคอขวด เขย่าผสมกัน จนตัวยาละลายหมด (จะได้ความ เข้มข้นประมาณ 25%) ใช้ทาบริเวณที่เป็นเกลื้อน หลังอาบน้ำ วันละหลายครั้ง	ยาที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ ภายใน 15 วัน

16. ยาบำรุงร่างกาย

ชื่อยา	สรรพคุณ	ขนาดและวิธีใช้	คำเตือน
1.วิตามินยาเม็ดบีรวม	ป้องกันการขาดวิตามินบี และบำรุงร่างกาย	รับประทานวันละ 1 ครั้งหลังอาหาร ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด	ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
2.ยาเม็ดวิตามินซี	ป้องกันการขาดวิตามินซี	รับประทานวันละ 1 ครั้ง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด	ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ห้ามใช้เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี
3.ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต	รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่	รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร	1) ในช่วงรับประทานยาอาจจะจะมีสีดำ 2) หากเกิดอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้ ควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือค่อยๆเพิ่มขนาดของยาจนถึงขนาดที่แนะนำให้ใช้
4.ยาเม็ดวิตามินรวม	ป้องกันการขาดวิตามินสำหรับผู้ใหญ่	รับประทานวันละ 1 เม็ด	ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้
5.น้ำมันตับปลาคอดแลปซูล	ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D	ผู้ใหญ่รับประทานวันละ 1 เม็ด	ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้
6.น้ำมันตับปลาคอดน้ำ		เขย่าขวดก่อนใช้ เด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป รับประทานวันละ 1 ช้อนชา เด็กอายุ 1-4 ปี รับประทานวันละ 1/2 ช้อนชา เด็กแรกเกิด -1 ปี รับประทานวันละ 1/4 ช้อนชา	ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้